

MATHS POUR L'IMAGE : ALGÈBRE LINÉAIRE ET GÉOMÉTRIE
Fiche d'exercices 1 - espaces vectoriels

Exercice 1 - espaces vectoriels

Dans $E = \mathbb{R}^2$, on définit l'addition entre vecteurs et la multiplication par un scalaire réel des façons suivantes. E est-il alors un espace vectoriel ?

1. $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ et $\lambda \cdot (x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$
2. $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1, x_2)$ et $\lambda \cdot (x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$
3. $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ et $\lambda \cdot (x_1, x_2) = (\lambda x_1, 0)$

Exercice 2 - sous-espaces vectoriels

1. Les parties suivantes de \mathbb{R}^3 en sont-elles des sous-espaces vectoriels ?
 - (a) $E_1 = \{(x, y, z) \mid x = 2z\}$
 - (b) $E_2 = \{(x, y, z) \mid y \neq 0\}$
 - (c) $E_3 = \{(x, y, z) \mid 5x - y + z - 4 = 0\}$
 - (d) $E_4 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$
2. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F + G = \{x = f + g \mid f \in F, g \in G\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 3 - dépendance linéaire

1. Les familles suivantes sont-elles libres ou liées ?
 - (a) $\{(6, 5), (3, 2)\}$
 - (b) $\{(6, 4), (3, 2), (1, 0)\}$
 - (c) $\{(0, 0), (1, 2)\}$
2. Soient $\{u, v, w\}$ une famille libre dans un espace vectoriel V . Montrer que :
 - (a) $\{u + v, v + w, u - w\}$ est une famille liée dans V
 - (b) $\{u + v, u - v, u + w\}$ est une famille libre dans V

Exercice 4 - générateurs, bases

1. Les familles suivantes sont-elles des bases de \mathbb{R}^3 ?
 - (a) $F_1 = \{(1, 0, 1), (2, 0, -1), (-1, 1, 2)\}$
 - (b) $F_2 = \{(1, -1, 0), (1, 2, 3), (0, 1, 1)\}$
2. Soit la famille de vecteurs de \mathbb{R}^4 $\{(0, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 0)\}$.
 - (a) Montrer que c'en est une base.
 - (b) Donner les coordonnées du vecteur $(1, 1, 1, 1)$ dans cette base.